

おうとう

佐藤 隆 発芽 展葉 開花始 満開 落花 収穫盛
4.2 4.25 4.24 4.30 5.13 6.24
平年値 (東横市東横) 北村山農業技術普及課調査

散布時期	適用病害虫名	散布薬剤名及び散布濃度 (薬液100ℓ当たり)	農業使用基準		10a当たり 散布量	注意事項 (収穫前日数 総使用回数)を表す	散布日 (月/日)	使用薬剤	使用濃度
			収穫前 使用時期	総使用 回数					
休眠期 (3月末迄)	ハダニ 重点防除	水 (98ℓ) (石灰硫黄合剤を使用する場合)	1. ハーベストオイル 50倍(2ℓ)	発芽前 7日前まで	-	400ℓ	/		
		2. アブロードフロアブル 又は、 石灰硫黄合剤 10倍(10ℓ)	発芽前	-					
開花1日前 (風船状)	灰星病 幼果菌核病 炭そ病 ハマキムシ類	1. トレノックスフロアブル	500倍(200cc)	21日前まで	5回以内	400ℓ	/		
		2. パイオマックスDF	2,000倍(50g)	前日まで	-				
咲開五分咲	星	幼果菌核病 せん孔病 灰星病	1. トップジンM水和剤	1,500倍(66.6g)	14日前まで	3回以内	600ℓ	/	
満開期 (八分咲)	病	灰星病 幼果菌核病 褐色せん孔病 ハマキムシ類	1. ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000倍(33.3g)	前日まで	3回以内	600ℓ	/	
		2. パイオマックスDF	2,000倍(50g)	前日まで	-				
満開10日後	点 防	灰星病 炭そ病 褐色せん孔病 (コアオカスミカメ)	1. スミレックス水和剤	1,500倍(66.6g)	14日前まで	3回以内	600ℓ	/	
		2. オーツサイド水和剤80	800倍(125g)	3日前まで	5回以内				
咲開5月中～ 下旬	除	コスカシバ	スカシバコンL	10a当たり40～100本を設置	広域的に設置する		/		
この回以降の散布は殺虫剤解禁後とする									
咲開 殺虫剤解禁後		ショウジョウバエ類 オウトウハマダラミバエ	1. アグロスリン水和剤*1	1,000倍(100g)	3日前まで	2回以内	600ℓ	/	
5月下旬	ウメシロコ カイガラ シ重点防除	灰星病	1. スコア顆粒水和剤	2,000倍(50g)	前日まで	3回以内	600ℓ	/	
		カイガラシ類 カメムシ類 ハダニ類	2. スプラサイド水和剤 3. ダニコングフロアブル	2,000倍(50g) 2,000倍(50cc)	7日前まで 前日まで	3回以内 1回			
6月上旬	灰星病 重点防除	灰星病 カメムシ類 ショウジョウバエ類	1. バレード15フロアブル	2,000倍(50cc)	前日まで	2回以内	500ℓ	/	
		2. テルスターフロアブル*1	3,000倍(33.3cc)	前日まで	2回以内				
6月中旬	灰星病 重点防除	灰星病 炭そ病 黒斑病 褐色せん孔病 オウトウショウジョウバエ	1. ナリアWDG	2,000倍(50g)	前日まで	3回以内	500ℓ	/	
		2. エクシレルSE	2,500倍(40cc)	前日まで	3回以内				
6月下旬	灰星病・黒斑病 重点防除	灰星病・黒斑病 オウトウショウジョウバエ	1. オンリーワンフロアブル	2,000倍(50cc)	前日まで	3回以内	500ℓ	/	
		2. アーデントフロアブル*1	2,000倍(50cc)	前日まで	3回以内				
晩生種中心 7月上旬	せん孔病 重点防除	灰星病・黒斑病 炭そ病 褐色せん孔病 オウトウショウジョウバエ	1. ナリアWDG	2,000倍(50g)	前日まで	3回以内	500ℓ	/	
		2. ダントツ水溶剤	2,000倍(50g)	前日まで	2回以内				
収穫直後	せん孔病 重点防除	せん孔病 ハマキムシ類 ウメシロカイガラシ アメリカシロヒトリ ハダニ類	1. オキシラン水和剤	600倍(166.6g)	収穫後～落葉前まで	3回以内	600ℓ	/	
		2. ダイアジノン水和剤34	1,000倍(100g)	14日前まで	2回以内				
咲開7月中～下旬	せん孔病 重点防除	せん孔病	1. オキシラン水和剤	600倍(166.6g)	収穫後～落葉前まで	3回以内	600ℓ	/	
		2. アブロードフロアブル	1,000倍(100cc)	7日前まで	2回以内				
8月上 ～中旬	せん孔病 重点防除	せん孔病 カイガラシ類幼虫 (ハダニ類)	1. オキシラン水和剤	600倍(166.6g)	収穫後～落葉前まで	3回以内	600ℓ	/	
		2. アブロードフロアブル	1,000倍(100cc)	7日前まで	2回以内				
咲開9月上～中旬	せん孔病 重点防除	せん孔病 灰星病 ウメシロカイガラシ	1. トップジンM水和剤	1,500倍(66.6g)	14日前まで	3回以内	600ℓ	/	
		2. ダイアジノン水和剤34	1,000倍(100g)	14日前まで	2回以内				
咲開9月中 ～10月中旬	せん孔病 重点防除	せん孔病	1. Zボルドー	500倍(200g)	-	-	600ℓ	/	
		2. クレフノン	100倍(1kg)	-	-				
落葉後	越冬病害虫 樹脂細菌病	1. 石灰硫黄合剤 又は、 I Cボルドー66D	10倍(10ℓ) 40倍(2.5kg)	発芽前	-	400ℓ	/		
		2. クレフノン	100倍(1kg)	-	-				

収穫前使用時期で「前日」とは24時間前である。
 オーツサイド水和剤80、オキシラン水和剤などキャプタンを含む剤の総使用回数は合計で5回以内である。
 オキシラン水和剤など有機銅を含む農薬の総使用回数は合計で3回以内である。
 ※1 合成ピレスロイド剤は害虫・魚毒が強いので、菜園・養魚池、河川などの近くでは絶対に使用しない。